

登録衛生検査所 臨 床 宮 崎 TEL0985-52-6688 FAX0985-52-8093

検査内容変更項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして、検査内容を一部変更させて頂きますのでご案内申し上げます。 何卒、ご利用、ご用命の程よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

● 検査内容変更項目:

■ 胃ABCD分類 (胃がんリスク層別化検査 ABC 分類)

◆ 変更内容:

本検査は、2014 年 12 月および 2015 年 6 月に発信された日本へリコバクター学会の注意 喚起(※1)を受けて検討された、胃がんリスク層別化検査運用研究会監修「運用の手引き」 (※2)の掲載内容に基づくものです。

ABC 分類における H.ピロリ抗体検査の判定基準を 10.0U/mL から 3.0U/mL といたします。

- (※1) 2015 年 6 月 30 日の日本ヘリコバクター学会の注意喚起では、「H.ピロリ抗体が陰性であっても 低値でない場合、胃がんリスクがない(A 群)と判定しないでください。」とされています。
- (※2) 新しい ABC 分類胃がんリスク層別化検査(ABC 分類)2016 年度改訂版 運用の手引き

監修:胃がんリスク層別化検査運用研究会

発行: 認定 NPO 法人 日本胃がん予知・診断・治療研究機構

【参考 URL】 http://www.gastro-health-noe.org

◆ 変更期日: 平成 29 年 3 月 30 日(金)受付分より

※ 詳細につきましては裏面をご参照ください

■ 胃ABCD分類

◆ 新検査内容:

	新·報告検査内容	現状内容
項 目コード	2453	同左
検 査 方 法	H. ピロリ抗体 : EIA 法 ペプシノゲン : ラテックス凝集法	同左
基準値	【 別紙報告 】 ●H. ピロリ抗体: (+) 3.0U/ml以上 ●ペプシノゲン: (+)PG I 値が 70.0ng/mL 以下 かつ PG I / II 比が 3.0 以下	【 別紙報告 】 ●H. ピロリ抗体: (+)10.0U/ml以上 ●ペプシノゲン: (+)PG I 値が 70.0ng/mL 以下 かつ PG I / II 比が 3.0 以下
単 位	●H. ピロリ抗体 : U/mL ●ペプシノゲン : ng/mL ●PG I / II 比 : 単位なし	同左
報告範囲	●H. ピロリ抗体: 3.0 未満~100 以上 ●ペプシノゲン: PG I 0.1 以下~最終値 PG II 0.1 以下~最終値 PG I / II 比 0.1 ~最終値 ●胃ABC判定: A、B、C、D	同左
所 要 日 数	5~7日	同左

◆ 新検査チャート見本 :

- 2017 年 4 月 3 日(月)出力分より、検査名称を「胃がんリスク層別化検査 ABC 分類」とし、H.ピロリ 抗体とペプシノゲンの検査試薬名及び検査方法を併記して報告させていただきます。
- 各群のコメントを改訂いたします。



※ 判定がABCDEと表記されておりますが、報告はABCDまでとさせて頂きますので予めご了承下さい